

千葉県外来種整理表（動物）

No.

分類	哺乳類	
和名	ハクビシン	
学名	Paguma larvata	
分類群	食肉目ジャコウネコ科	
土着生息地（原産地）	中国南東部、台湾、東南アジアなど	
分布・生息情報	日本での分布状況	本州以南
	千葉県での分布状況	ほぼ全域
	千葉県での生息状況	生息数・分布が増加拡大中。
移入経路	日本	毛皮用養殖個体の放逐・逸出
	千葉県	茨城県から分布拡大した可能性が高い。
移入年代	日本	太平洋戦争終戦前後ころ
	千葉県	1980年代（県内では1987年に死体が初記録）。
体重等	体重3～5kg 頭胴長48～60cm 尾長38～43cm	
生息環境	陸域：森林、農村地域、住宅地など	
生活史	夜行性。木登りが得意で樹上をよく利用する。	
繁殖	繁殖場所	樹洞、人家（屋根裏）
	時期	春～秋
	繁殖形態	2～4頭の子を出産
食性	雑食性（昆虫類、陸生貝類、小型の脊椎動物、果実など）	
生態系への影響	在来生物の捕食、在来の中型雑食獣との競合	
人への被害	農林水産業への被害	農作物被害（果実を好む。安房郡のミカン、ピワ、夷隅郡のナシなどに被害）
	生活被害	天井裏の糞尿被害・騒音
	生命身体への被害	現在のところ、なし
生態系又は人に対する影響度	A	
防除の緊急度	緊急度ランク	A
	緊急度の情報	全県的に生息し、果樹等の食害が増大している。地域的に生息を抑制するなどの対策が望まれる。
対策	予防対策	飼育管理の強化・外来種問題の普及啓発
	すでに定着している場合の対策	実態調査・捕獲駆除・食害の技術的防除
文献	全般	日本生態学会（2002）、鈴木（2005）
	千葉県	落合（1998）、千葉県生物学会（1999）、落合・浅田（2002）
写真・標本の有無（保管先）	剥製・骨格標本（千葉県立中央博物館）、写真（大木淳一・田辺浩明）	
備考		

千葉県の外來種整理表（植物）（案）

No.

分 類		
和 名		
学 名		
分 類 群		
原産地		
生育情報	日本での分布状況	
	千葉県での分布状況	
	千葉県での生育状況	
侵入経路	日本	
	千葉県	
侵入年代	日本	
	千葉県	
繁殖	繁殖形態	
	種子散布形態	
	時期	
生態系又は人への影響度	影響度ランク	
	影響の情報	
防除の緊急度	緊急度ランク	
	緊急度の情報	
防除の容易性	容易性ランク	
	容易性の情報	
対 策	導入・逸出防止対策	
	定着している場合の対策	
文 献	全般	
	千葉県	
備 考		